

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : Jurnal Ilmiah**

Judul karya ilmiah (paper) : Pertumbuhan Karang Lunak Sarcophyton sp. yang Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara.

Jumlah Penulis : 4 orang

Status Pengusul : Penulis anggota

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : Buletin Oseanografi Marina  
 b. ISBN/ISSN : 2089-3507  
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : April 2017,  
 d. Penerbit/organiser : Departement of Oceanography, Faculty of Fisheries and Marine Science, Diponegoro University  
 e. Alamat repository PT/web prosiding :  
 PROSIDING : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15744>  
 ARTIKEL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15744/11764>  
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional  
☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
☒ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	4,00		1	0.6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,00		3	1.7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,00		3	2.0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12,00		3	1
<b>Total = (100%)</b>	<b>40,00</b>		<b>10</b>	<b>5.3</b>
<b>Nilai Pengusul = 60% * 35 = 21,00</b>				

Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer :

- jumlah Ref 42

- Kedalaman  $\frac{15}{42} \rightarrow 35.71\% \rightarrow \frac{17}{30} \times 3 = 1.7$

- Kemutakhiran  $\frac{19}{42} \rightarrow 45.2\% \rightarrow \frac{20}{30} \times 3 = 2.0$

Ditujukan dari ref 42 ke terakreditasi.

Prof. Dr. Ir. Supriharyono, MS  
 NIP. 41007151978021001  
 Unit kerja : Ilmu Kelautan FPIK Undip

- Kelengkapan isi jurnal kurang lengkap = 0.6  
 - Kelengkapan unsur & kualitas terbitan kurang lengkap = 1

$$0.7 + 0.6 = 0.65$$

$$\frac{0.4 \times 5.3}{3} = 0.7$$

$$0.7 + 0.6 = 1.06$$

C 30

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : Jurnal Ilmiah**

Judul karya ilmiah (paper) : *Pertumbuhan Karang Lunak Sarcophyton sp. yang Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara.*

Jumlah Penulis : 4 orang

Status Pengusul : Penulis anggota

Identitas Makalah :

- a. Judul Prosiding : Buletin Oseanografi Marina
- b. ISBN/ISSN : 2089-3507
- c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : April 2017,
- d. Penerbit/organiser : Departement of Oceanography, Faculty of Fisheries and Marine Science, Diponegoro University
- e. Alamat repository PT/web prosiding :

PROSIDING : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15744>

ARTIKEL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15744/11764>

f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- ☒ Jurnal Ilmiah Internasional
- ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Partly  
Klarifikasi!

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	4,00		1	0,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,00		3	2?
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,00		3	1?
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12,00		3	1?
Total - (100%)	40,00		10	?
Nilai Pengusul = 60% * 35 = 21,00				

Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer:

1) Reviewer bilang ilmu penulis utama tetapi kurang sesuai bagi penulis anggota.

2) Pembahasan cukup mendalam dikulung 42 pustaka, namun kurang mutakhir & kemutakhiran (10th terakhir) =  $\frac{17}{42} \times 100 = 40.48\%$

Sitasi =  $\frac{15}{42} \times 100\% = 35.71\%$

Semarang,  
Reviewer 1

6-10-2018

3) Data/informasi agak "melewatkan" karena SPK Penelitian tad 14 April 2011 tetapi penelitian Garu dilakukan 14 Juni - Desember 2012

Prof. Dr. Ir. Sytrisno Anggoro, MS  
NIP. 195212111976031003  
Unit kerja : Ilmu Kelautan FPK Undip

dan Publikasi April 2017 (perlu klarifikasi)!

4) Unsur dan kualitas terbitan kurang baik karena ada beberapa skripsi dan Tesis dijadikan Referensi.

# Pertumbuhan Karang Lunak *Sarcophyton* sp. yang Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara.

*by* Agus Trianto

---

**Submission date:** 06-Dec-2019 04:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1228475672

**File name:** Prosiding\_1.pdf (528.08K)

**Word count:** 2804

**Character count:** 17064



**Pertumbuhan Karang Lunak *Sarcophyton* sp. yang Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara****Diah Permata Wijayanti\*, Ayu Charismawaty, Elis Indrayanti, Agus Trianto****PENDAHULUAN**

Fauna invertebrata laut, termasuk karang lunak telah lama dimanfaatkan sebagai sumber berbagai bahan obat alam yang bernilai farmaseutika dan kosmetika (Blunt *et al.*, 2012; 2013), selain diperdagangkan sebagai hiasan akuarium (Barton *et al.*, 2015). Permintaan yang tinggi menyebabkan karang lunak di banyak kawasan terumbu dunia dipanen dalam jumlah besar (Barton *et al.*, 2015). Rusaknya habitat, yang disertai pengambilan yang berlebihan untuk

keperluan hiasan akuarium maupun keperluan lain menyebabkan jumlah populasi karang lunak menurun dengan cepat. Lebih dari 1500 spesies biota dan tumbuhan perairan diperjual-belikan di seluruh dunia, 80% diantaranya sesungguhnya dapat dibudidayakan (Winfree, 1989). Sebanyak 1,5 juta karang diperdagangkan sejak 2007 dan sebagian besar berasal dari Indonesia (Bruckner dan Borneman, 2010). Salah satu spesies karang lunak yang dikhawatirkan mengalami penurunan jumlah adalah *Sarcophyton* sp.

\*Corresponding author <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma>  
buloma.undip@gmail.com

Diterima/Received : 31-01-2017  
Disetujui/Accepted : 15-03-2017

Temraz *et al.* (2006) menyatakan, selain pengambilan yang berlebihan untuk tujuan dijadikan hiasan pada akuarium air laut, saat ini *Sarcophyton* sp. banyak diambil untuk ekstraksi senyawa bioaktif. *Sarcophyton glaucum* yang tersebar luas di Indo-Pasifik diketahui memiliki kandungan senyawa bahan aktif yang beragam (Sella dan Banayahu, 2010). Sabdono dan Radjasa (2006) menunjukkan hasil isolasi enam bakteri yang berasosiasi dengan *Sarcophyton* sp. memiliki kemampuan menghalangi pertumbuhan sedikitnya satu dari tujuh isolat pembentuk bio-film. *S. crassocaula* diketahui memiliki potensi sitotoksik terhadap sel kanker kandung kemih (Su *et al.*, 2011). *Sarcophyton* juga dinyatakan mengandung diterpenoid laut yang dapat dimanfaatkan sebagai agen anti-inflamasi (Gonzalez *et al.*, 2015). Aktivitas anti-bakterial juga ditemukan pada *S. trocheliophorum* (Gomaa *et al.*, 2015).

Meningkatnya permintaan akan karang ornamental tidak dibarengi dengan peningkatan penyediaan stock di alam. Kondisi ini kemudian melahirkan beragam teknik untuk membudidayakan species tersebut (Ellis dan Sharon, 1999; Ellis dan Ellis, 2002). Saat ini karang dibudidayakan dengan 3 tujuan utama yaitu sebagai sediaan bioprospeksi yang berpotensi sebagai bahan obat (Blunt *et al.*, 2012, 2013; Leal *et al.*, 2013; Rocha *et al.*, 2011), untuk biota pengisi akuarium (Olivotto *et al.*, 2011; Rhyne *et al.*, 2012) dan untuk keperluan restorasi terumbu (Rinkevich, 2005; Shafir *et al.*, 2006). Propagasi karang berdasar kemampuan bereproduksi secara aseksual, menjadi metode yang umum digunakan untuk memproduksi banyak anakan guna keperluan budidaya (Soong dan Chen, 2003; Olivotto *et al.*, 2011; Rhyne *et al.*, 2012; Yunus *et al.*, 2013; Wijayanti *et al.*, 2015).

*Sarcophyton* sendiri telah dicoba untuk dibudidayakan sebagai sediaan bahan obat maupun sebagai hiasan akuarium (Sella dan Banayahu, 2010; Leal *et al.*, 2013; Costa *et al.*, 2016). Sella dan Banayahu (2010) melakukan budidaya dengan teknik pemotongan koloni dan dilakukan pada sistem tertutup. *Sarcophyton* juga dicoba dibudidayakan menggunakan cahaya dengan intensitas rendah (Rocha *et al.*, 2013). Costa *et al.* (2016) melakukan budidaya ex-situ system re-sirkulasi air dengan pemberian pakan rotifer.

Upaya penelitian karang lunak di Perairan Indonesia masih sangat sedikit dan kurang berkembang (Manuputty, 2010). Saat ini penelitian yang melibatkan karang lunak sebagai

objek, umumnya ditujukan untuk mencari potensi senyawa aktif yang terkandung di dalamnya (Anta *et al.*, 2002; Kapojos *et al.*, 2008; Januar *et al.*, 2010; Soedharma *et al.*, 2005). Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kelangsungan hidup transplan karang lunak *Sarcophyton* sp. masih jarang dilakukan (Rocha *et al.*, 2013). Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang lunak *Sarcophyton* sp. sekaligus memberi informasi tentang potensi pemanfaatan perairan Teluk Awur dalam upaya budidaya karang lunak.

## MATERI DAN METODE

### *Pengambilan dan Persiapan Sampel*

Sampel berupa koloni sehat dari *Sarcophyton* sp. Koloni induk diambil dari Perairan Bandengan, Kabupaten Jepara (S 06°33'057" E 110°39'257"). Perairan Bandengan dipilih karena kondisi koloni *Sarcophyton* sp. yang ditemukan di perairan Bandengan sangat baik. Selain jumlah koloni yang banyak, ukuran koloni yang hidup di Perairan Bandengan rata-rata berdiameter lebih dari 1 m. Sampel diperoleh dari 5 koloni induk yang berdiameter  $\pm 20$ -50 cm. Setiap koloni induk hanya diambil 25% dari seluruh luas permukaan koloni untuk menghindari kematian induk donor. Fragmen dipotong menggunakan *cutter* di bagian mahkota koloni (Ellis dan Ellis, 2002; Rocha *et al.*, 2013). Selanjutnya fragmen yang diperoleh dimasukkan kotak pengangkut yang telah diberi air laut sebagai media dan dibawa ke Laboratorium Basah Marine Station Teluk Awur Jepara untuk dilakukan proses aklimatisasi selama 7 hari.

Fragmen yang telah diaklimatisasi selanjutnya dipotong menggunakan *cutter* dengan ukuran diameter  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup> sebanyak 11 fragmen dan 12-15 cm<sup>2</sup> sebanyak 9 fragmen. Jumlah fragmen menyesuaikan sediaan fragmen yang telah diaklimatisasi. Selanjutnya sampel ditanam di media substrat semen berdiameter  $\pm 10$  cm dan ketebalan  $\pm 2,5$  cm sebelum dipindahkan ke media budidaya berupa rak budidaya. Fragmen direkatkan menggunakan *cable ties* kecil. Fragmen disusun secara acak di dalam rak budidaya untuk mengurangi perbedaan kondisi penanaman sebesar mungkin. Jarak tanam setiap fragmen 10 cm, agar saat fragmen tumbuh tidak saling bersentuhan.

### *Penanaman Sampel di Rak Budidaya*

Fragmen karang lunak ditanam di rak budidaya yang terbuat dari besi L dengan ukuran

1x1 m dan tinggi dari dasar laut sekitar 75 cm. Kerangka rak besi kemudian dilapisi dengan jaring-jaring yang berfungsi untuk meletakkan fragmen dan sebagai pelindung dari gangguan arus maupun penumpukan sedimen. Setiap kaki-kaki rak budidaya dilengkapi dengan pot yang berisi semen untuk menguatkan struktur rak budidaya saat ditanam di lokasi budidaya.

Selanjutnya rak budidaya diletakkan di Perairan Teluk Awur, Jepara (S 06° 36' 58,7" dan E 110° 38' 18,8"). Lokasi budidaya dipilih berdasar pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak koloni karang hidup, sehingga dianggap memiliki kesesuaian dengan habitat alami karang lunak. Selain itu lokasi juga jauh dari gangguan aktivitas manusia dan memiliki kedalaman yang cukup untuk kehidupan dan pertumbuhan karang lunak. Rak budidaya ditanam pada kedalaman 3 m.

#### Pengambilan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Pengamatan dilakukan selama 160 hari (14 Juni 2012 hingga Desember 2012). Fragmen diamati setiap 2 minggu sekali dengan mencatat pertumbuhan fragmen menggunakan jangka sorong. Pada saat pengukuran juga dilakukan pengambilan foto fragmen menggunakan kamera bawah air. Hasil foto kemudian diolah menggunakan software CPCe (Coral Point Count with Excel extension) untuk mengetahui pertambahan jumlah luasan karang lunak. Software CPCe dikembangkan oleh National Coral Reef Institute dan Oceanographic Center, Nova Southeastern University (Kusumo, 2012). CPCe dirancang untuk menghitung secara cepat tutupan karang, panjang serta luas koloni karang melalui gambar (Kohler dan Gill, 2006).

#### Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengolah data menggunakan analisis deskriptif. Data dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate)  
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan persamaan (Ricker, 1975 dalam Pratama 2005):  $SR = (N_t / N_0) \times 100 \%$   
 $SR$  = Kelulushidupan  
 $N_t$  = Jumlah transplan yang hidup  
 $N_0$  = Jumlah awal yang ditransplan
2. Pertumbuhan (Growth)  
Menurut Supriyanto (2000) dalam Kaleka (2004) pertumbuhan fragmen karang lunak dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

Pertambahan Panjang = panjang akhir – panjang awal

3. Laju pertumbuhan karang lunak  
Menggunakan persamaan yang terdapat pada Sadarun (1999), yaitu :

$$\beta = \frac{Lt + 1 - l1}{ti + 1 - t1}$$

Keterangan :

- $\beta$  : Laju pertumbuhan panjang/lebar karang lunak (cm)  
 $Lt+1$  : Rata-rata panjang/lebar karang lunak pada waktu ke-t+1 (cm)  
 $Lt$  : Rata-rata panjang/lebar karang lunak ada saat waktu ke-1 (cm)  
 $Ti+1$  : Waktu pengamatan ke-i+1  
 $Ti$  : Waktu pengamatan ke-t

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmen karang lunak menunjukkan respon stres saat dilakukan pemotongan. Fragmen *Sarcophyton* sp. nampak mengkerut dan menjadi keras. Sebagai respon terhadap perubahan kondisi lingkungan, karang lunak mengalami penyusutan jaringan. Saat fragmen dipindahkan ke bak aklimatisasi selain mengalami penyusutan tubuh, fragmen karang lunak juga mengeluarkan lendir.


#### Tingkat Kelangsungan Hidup Fragmen *Sarcophyton* sp.

Berdasarkan penelitian selama 160 hari diperoleh tingkat kelangsungan hidup *Sarcophyton* sp. dengan luas awal fragmen  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup> sebesar 63.64%, sedangkan fragmen dengan ukuran awal  $> 12$ -15 cm<sup>2</sup> tingkat kelangsungan hidupnya sebesar 77.78% (Tabel 1).

Dari jumlah total 11 fragmen ukuran awal  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup>, 3 fragmen mengalami penurunan luas mahkota pada hari ke-9 (Gambar 1). Hari ke-9, 2 fragmen dengan luas awal  $> 12$ -15 cm<sup>2</sup> mengalami kematian. Selanjutnya fragmen yang tersisa mampu bertahan sampai hari pengukuran terakhir, sehingga jumlah fragmen yang mampu bertahan hingga akhir sebanyak 7 fragmen. Hari ke-90, 4 buah fragmen dengan luas awal  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup> mengalami kematian. Dengan demikian total 7 fragmen  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup> yang mampu bertahan hingga hari pengamatan terakhir (Tabel 1).

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelangsungan hidup *Sarcophyton* sp. adalah 63,64% (fragmen  $\approx 10$ -12 cm<sup>2</sup>) dan 77,78% (fragmen  $> 12$ -15 cm<sup>2</sup>). Mahardini (2011) pada penelitiannya menyampaikan tingkat kelangsungan hidup *Sarcophyton* sp. sebesar 100%. Perbedaan ini terjadi karena adanya





**Gambar 1.** Fragmen *Sarcophyton* sp. (A) fragmen  $\approx 10-12$  cm<sup>2</sup> saat awal penanaman, (B) Fragmen  $\approx 10-12$  cm<sup>2</sup> pada hari ke-9, (C) Fragmen  $>12-15$  cm<sup>2</sup> saat awal penanaman, (D) Fragmen  $>12-15$  cm<sup>2</sup> saat pengukuran pada hari ke-9.

**Tabel 1.** Data Kelangsungan Hidup Fragmen *Sarcophyton* sp.

Ukuran Awal Fragmen	Jumlah Fragmen			Tingkat Kelangsungan Hidup
	Awal	Mati	Sisa	
$\approx 10-12$ cm <sup>2</sup>	11	4	7	63,64%
$>12-15$ cm <sup>2</sup>	9	2	7	77,78%

perbedaan lingkungan penelitian. Penelitian oleh Mahardini (2011) dilaksanakan di laboratorium dengan parameter lingkungan terkontrol, sehingga sesuai dengan kondisi optimal yang dibutuhkan oleh karang lunak untuk hidup. Selain itu sedimentasi dianggap tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan karang lunak yang dilakukan pada bak penanaman. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan di perairan dengan kondisi perairan yang fluktuatif, menyebabkan fragmen mengalami tekanan dari lingkungan yang lebih beragam. Sehingga menyebabkan sejumlah fragmen tidak mampu bertahan dan mati.

Budidaya sistem tertutup memberikan keuntungan dalam budidaya *Sarcophyton* secara masal karena lebih terkontrol. Namun faktor lingkungan laut ternyata berpengaruh besar pada hasil pertumbuhan fragmen (Sella

dan Benayahu, 2010). Budidaya sistem tertutup juga diterapkan pada budidaya *Sarcophyton* yang diikuti dengan pemberian cahaya dengan intensitas rendah. Tujuannya untuk mengurangi biaya selama pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cahaya intensitas rendah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sintasan dan pertumbuhan fragmen. Intensitas cahaya yang rendah terbukti mengurangi biaya pemeliharaan tanpa mengurangi kemampuan fragmen berfotosintesa dan menghasilkan senyawa bioaktif melalui zooxanthella (Rocha *et al.*, 2013). Namun teknik ini membutuhkan instalasi yang memadai agar potensi *Sarcophyton* sebagai penghasil senyawa bioaktif tidak mengalami

penurunan (Rocha *et al.*, 2013). Namun saat budidaya dilakukan di laut, potensi karang lunak untuk menghasilkan senyawa aktif menurun (Yulianti, 2009). Fragmen *Sinularia* dan *Lobophytum* memiliki aktivitas hambat yang menurun setelah ditanam di lokasi budidaya, yaitu di Pulau Seribu. Diduga kondisi lingkungan laut mempengaruhi senyawa aktif yang dihasilkan masing-masing species karang lunak (Yulianti, 2009).

Budidaya di laut memberikan keuntungan tidak diperlukannya pemberian pakan secara rutin untuk mendukung pertumbuhan fragmen. Percobaan pemberian pakan rotifer pada fragmen *Sarcophyton* yang dilakukan Costa *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pemberian pakan rotifer tidak memberi pengaruh nyata pada pertumbuhan *Sarcophyton cf. glaucum*.

#### **Pertumbuhan Fragmen *Sarcophyton* sp.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmen *Sarcophyton* sp. ukuran  $\approx 10-12$  cm<sup>2</sup> memiliki nilai rata-rata pertumbuhan  $74,68 \pm 19,85$  cm<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan 0,47 cm<sup>2</sup>/hari. Sedangkan untuk fragmen *Sarcophyton* sp. dengan ukuran awal  $>12-15$  cm<sup>2</sup> diketahui memiliki rata-rata pertumbuhan  $60,41 \pm 22,96$  cm<sup>2</sup>, laju pertumbuhan 0,38 cm<sup>2</sup>/hari (Tabel 2).

Masa kritis pertumbuhan terjadi ketika waktu awal pertambahan luas pertama hingga hari ke-9. Pada penelitian ini seluruh fragmen mengalami fase penyesuaian lingkungan. Kedua ukuran awal fragmen mengalami pertumbuhan yang meningkat sejak hari ke-25 hingga hari ke-42 (Gambar 2).

Fragmen karang lunak melekat pada substrat dengan cara meregenerasi dan memperluas jaringan dengan membentuk jaringan yang lunak dan jaringan kerangka (Soong dan Chen, 2003). Hari ke-42 fragmen mampu menempel dengan sempurna secara keseluruhan. Fragmen karang lunak dinyatakan berada pada kondisi yang baik. Tubuh karang lunak *Sarcophyton* sp. terlihat mengembang sempurna serta tentakel-tentakel menjulur keluar. Hari ke-55 suhu perairan tercatat 29<sup>o</sup> C, salinitas 34‰ dan pH 7. Tingkat keasaman (pH) berada di bawah batas

optimal untuk pertumbuhan karang lunak. Hari ke-55 *Sarcophyton* sp. dengan luas awal  $>12-15$  cm<sup>2</sup> mengalami penurunan luas sebesar 1,31 cm<sup>2</sup>.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, ukuran awal fragmen berpengaruh besar dalam kelulushidupan dan laju pertumbuhan fragmen, baik karang keras (Bowden-Kerby, 2001; Soong and Chen, 2003; Okubo *et al.*, 2005; Forsman *et al.*, 2006; Habibi *et al.*, 2013; Shafir dan Rickevich, 2013; Diah Permata *et al.*, 2015) maupun karang lunak (Rocha *et al.*, 2003). Namun pada penelitian ini, fragmen dengan ukuran awal lebih besar justru memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Hal ini diduga bahwa kondisi fragmen yang luas cenderung mengakumulasi sedimen lebih banyak dibandingkan fragmen dengan luasan yang lebih kecil. Kondisi lingkungan seperti sedimentasi, predasi, dan kompetisi turut mempengaruhi pertumbuhan fragmen yang dibudidayakan di laut (Vijayavel dan Richmond, 2012; Shafir dan Rinkevich, 2013). Diketahui kondisi Teluk Awur saat budidaya dilakukan mengalami sedimentasi yang tinggi, sehingga memberi pengaruh terhadap pertumbuhan fragmen (Tabel 3).


Perairan mengalami surut yang sangat rendah pada hari ke-90 hingga ke-112. Surut drastis mengakibatkan kedalaman perairan menyusut hingga mencapai 120 cm. Data luasan fragmen *Sarcophyton* sp. terus mengalami penurunan sejak hari ke-90. Hari ke-112 pertumbuhan fragmen karang lunak mengalami penurunan sebesar 0,65 cm<sup>2</sup> untuk fragmen berukuran awal  $\approx 10-12$  cm<sup>2</sup> dan fragmen dengan ukuran awal  $>12-15$  cm<sup>2</sup> mengalami penurunan sebesar 7,31 cm<sup>2</sup>. Pada pengambilan data hari ke-112 kondisi karang lunak diperparah dengan sedimentasi yang tinggi hingga menutupi hampir seluruh bagian tubuh karang lunak. Fabricius dan Alderslade (2001) menjelaskan bahwa adukan sedimen yang tinggi dapat menyerap asupan cahaya sehingga menghambat proses fotosintesis. Sedimentasi yang tebal juga mampu menekan karang lunak dengan menutupi sebagian atau seluruh tubuh karang lunak.

Laju sedimentasi terendah perairan Teluk Awur tercatat sebesar 10,2 g/cm<sup>2</sup>/hari. Laju

**Tabel 2.** Data Pertumbuhan dan Laju Pertumbuhan Total *Sarcophyton* sp.

Luas awal fragmen	Rata-rata pertumbuhan (cm <sup>2</sup> ±SD)	Pertumbuhan per hari (cm <sup>2</sup> /hari)
$\approx 10-12$ cm <sup>2</sup>	$74,68 \pm 19,85$	0.47
$>12-15$ cm <sup>2</sup>	$60,41 \pm 22,96$	0.38



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan *Sarcophyton* sp.

Tabel 3. Data Laju Sedimentasi

Sedimen Trap	Laju Sedimentasi Pengamatan ke -(g/cm²/hari)				
	I	II	III	IV	V
A	9.1	7.6	7.7	27.7	53.2
B	16.1	7.6	14.7	18.7	55.1
C	10.8	15.4	8.4	18.0	46.7
Rata-rata (g/cm²/hari)	12.0	10.2	10.3	21.5	51.7
St. Deviasi	3.65	4.5	3.8	5.4	4.4

sedimentasi ini masuk kategori sedang-bahaya (Tabel 3). Laju sedimentasi tertinggi perairan Teluk Awur tercatat 51,7 g/cm²/hari yang tergolong kategori bahaya-katastropik, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kelimpahan karang secara drastis, kerusakan parah pada komunitas, kematian koloni karang, hampir tidak terjadi peremajaan di ekosistem tersebut, serta munculnya spesies baru yang menginvasi (Supriharyono, 2007).

Kondisi perairan yang mengalami surut selama beberapa waktu pengamatan diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan fragmen *Sarcophyton* sp. Alga dan lumut nampak menutupi substrat buatan, bahkan hingga permukaan fragmen *Sarcophyton* sp. Luas fragmen karang lunak menurun pada hari ke-99 dan 112. Penurunan luas terbesar terjadi pada fragmen dengan luas awal >12-15 cm² yakni sebesar 7,31 cm². Luas fragmen karang lunak meningkat pada hari ke-130 hingga hari ke-160.

Fragmen dengan ukuran awal < ≈10-12 cm² tercatat mengalami penambahan luas hingga 74,7 cm². Fragmen berukuran > >12-15 cm² mengalami pertumbuhan sebesar 60,4 cm². Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada penelitian laboratorium. Pertumbuhan *Sarcophyton* sp. tercatat mengalami penyusutan sebesar luas 3,8 cm² (laju pertumbuhannya

mengalami penurunan 0,54 cm²/minggu) (Mahardini, 2011). Penyusutan dialami pula pada penelitian yang dilakukan di lapangan, namun hal ini hanya menjadi respon awal ketika fragmen sedang menyesuaikan diri pada lingkungannya sebelum mampu tumbuh, serta ketika terjadi penurunan permukaan air laut (surut) yang drastis.

## 2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transplan karang lunak *Sarcophyton* sp. mampu hidup di perairan Teluk Awur, Jepara dengan rerata tingkat kelangsungan hidup *Sarcophyton* sp. berkisar antara 63,6–77,8 %. Pertumbuhan transplan karang lunak *Sarcophyton* sp. tertinggi terlihat pada fragmen karang dengan ukuran ≈10-12 cm² yakni sebesar 74,7±19,8 cm². Untuk fragmen dengan luas awal >12-15 cm² memiliki pertumbuhan sebesar 60,4±23 cm². Ukuran luas awal fragmen ≈10-12 cm² memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fragmen karang lunak dengan ukuran luas awal >12-15 cm², meskipun tidak signifikan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional yang telah

memberi bantuan pendanaan melalui Hibah Kompetensi 2011 dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Kompetensi Nomor: 353/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011.





# Pertumbuhan Karang Lunak Sarcophyton sp. yang Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara.

## ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Zulfikri Isnaen, Abimanyu Putra Pratama, Adriati Annisa Utami, Aldo Restu Agi Prananda et al. "Carbon stock estimation of seagrass species thalassia hempricii using planet imagery with band ratio transformation in nirwana beach, padang city", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019

Publication

2%

2

Dwijowati Asih Saputri, Agustina Mutiarasari. "PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI TEPUNG WORTEL (Daucus carota L.) DAN TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita moschata D.) TERHADAP WARNA PADA IKAN KOI (Cyprinus carpio haematopterus)", BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi), 2017

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

